

Fiche Repères

PROTECTION FONGICIDE DES ORGES : COMMENT BIEN LA RAISONNER ?

Le raisonnement de la protection des orges d'hiver s'appuie sur un complexe parasitaire dominé par 3 maladies : la rhynchosporiose, l'helminthosporiose et la ramulariose.

1. RÉDUIRE LE RISQUE MALADIE

Pour cela, il est conseillé de limiter la présence d'inoculum pathogène dans les parcelles et de réduire les facteurs de risque de développement de la maladie grâce à des pratiques culturales adaptées. Cependant, toutes les pratiques n'ont pas le même effet sur les maladies. La tolérance variétale reste la base du raisonnement de la protection contre les maladies.

Inoculum		Broyage des résidus pailles (enfouis)	Destruction des repousses céréales et graminées	Travail au sol	Rotation
	Oidium	●	●	○	○
	Rhynchosporiose	●	●	○	● Si non retour d'orge trop rapide
	Helminthosporiose	●	●	○	○
	Rouille naine	●	●	○	○
	Ramulariose	○	○	○	○

Conduite culture		Fertilisation azotée plus faible	Densité de semis plus faible	Dates de semis	Variétés peu sensibles
	Oidium	●	●	● Si semis tardif	●
	Rhynchosporiose	●	●	● Si semis tardif	●
	Helminthosporiose	●	●	● Si semis tardif	●
	Rouille naine	●	●	● Si semis tardif	●
	Ramulariose	●	○	○	●

LÉGENDE :



PAS D'EFFET CONNU



FAIBLE : Technique culturale sans effet majeur sur la baisse de pression maladies



FAIBLE À MOYEN : Technique culturale ayant un effet moyen à faible et plus irrégulier sur la baisse de pression maladies



MOYEN : Technique culturale ayant un effet moyen sur la baisse de pression maladies



IMPORTANT : Technique culturale pouvant entraîner une forte baisse de la pression maladies


Nuisibilité

Helminthosporiose	30 q/ha
Rhynchosporiose	30 q/ha
Rouille naine	25 q/ha
Grillures	20 q/ha
Ramulariose	20 q/ha
Oidium	10 q/ha

Nuisibilité en q/ha - Source : Arvalis (année à forte pression)

REPÈRE

Nuisibilité moyenne des maladies en orges d'hiver en France
15 q/ha



2. METTRE EN ŒUVRE LES BONNES MÉTHODES

La réussite de la protection contre les maladies passe par la protection fongicide et la combinaison de leviers agronomiques.



Maladies

	Lutte biologique	Stimulateur défense plantes	Leviers agronomiques	Fongicide en végétation
Oïdium	○	●	●	●
Rhynchosporiose	○	○	●	●
Helminthosporiose	○	●	●	●
Rouille naine	○	○	●	●
Ramulariose	○	○	○	●
Piétin-verse	○	○	●	●

LÉGENDE :
 ○ PAS D'EFFET CONNU
 ● FAIBLE À MOYEN : Technique culturale ayant un effet moyen à faible et plus irrégulier sur la baisse de pression maladies
 ● MOYEN : Technique culturale ayant un effet moyen sur la baisse de pression maladies
 ● IMPORTANT : Technique culturale pouvant entraîner une forte baisse de la pression maladies

Stades clés

	Période de contrôle	Seuils d'intervention	
		Variétés sensibles	Variétés MS ou PS
Oïdium	Du stade épi 1 cm au stade sortie des barbes	Plus de 20 % de feuilles atteintes	Plus de 50 % de feuilles atteintes
Rhynchosporiose	Du stade 1 nœud au stade sortie des barbes	Plus de 10 % de feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > à 1 mm depuis le stade 31	Plus de 10 % de feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > à 1 mm depuis le stade 31
Helminthosporiose	Du stade 1 nœud à épisaison	Plus de 10 % de feuilles atteintes - seuil atteint en prenant en compte les taches de rhynchosporiose en plus	Plus de 25 % de feuilles atteintes - seuil atteint en prenant en compte les taches de rhynchosporiose en plus
Rouille naine	Du stade 1 nœud à épisaison	Plus de 10 % de feuilles atteintes	Plus de 50 % de feuilles atteintes
Piétin-verse	Du stade 30 au stade 1 nœud	À surveiller dans les situations de semis précoces et limons	
Ramulariose - Grillures polliniques	Du stade dernière feuille à épisaison	Dès les premiers symptômes sur les 4 dernières feuilles	

- 1. Repérer** avec précision les **stades clés** de la culture et observer l'évolution des symptômes à chaque période d'intervention (cf BSV régionaux).
- 2. Analyser l'effet du climat** à partir de modèles climatiques tels que xarvio® FIELD MANAGER pour la rhynchosporiose et helminthosporiose sur orge d'hiver.
- 3. Ajuster** à la hausse ou à la baisse **les doses** prévues initialement.




REPÈRE

En cours de campagne,
ajuster
 les pratiques
 selon les
risques
 climatiques



3. PÉRENNISER L'EFFICACITÉ DES FONGICIDES

En complément des mesures agronomiques et afin de préserver et prolonger l'efficacité maximum des fongicides orges, il est nécessaire d'intégrer la gestion des modes d'actions fongicides dans la construction des programmes et au moment des applications :

3 règles pour la construction des programmes



3 règles au moment des applications



BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <https://agriculture.gouv.fr/ecophyto-2030>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou <https://phytostimdata.com>. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 603CETE0925R. Septembre 2025.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.